



MODE D'EMPLOI

Epancher ACTISAN 360 de façon homogène par-dessus la paille ou directement sur les zones de repos à raison de :

• BOVINS :

– *Litières profondes* :

Dose d'attaque : 300 g/adulte tous les 2 jours.

Dose d'entretien : 200 g/adulte tous les 2 jours ; 100 g/veau tous les 2 jours.

Répéter la dose d'attaque 1 semaine par mois.

– *Logettes* : 100 g/vache tous les 2 jours (sur le dernier tiers de la logette).

– *Pédiluves à sec* : mettre 5 cm d'ACTISAN 360 dans le bac placé dans un point de passage (ex. sortie de la salle de traite). Utiliser une à plusieurs fois par mois suivant besoin.

• OVINS-CAPRINS :

25 g/adulte tous les 2 jours (doubler la dose en période de mise bas).

• PORCS :

– Maternité : 100 g/m² tous les 2 jours dans les zones humides.

– Engraissement : 100 g/m² par semaine dans les zones humides.

• VOLAILLES :

100 g/m² par semaine à partir de la troisième semaine dans les zones de couchages.

• CHEVAUX :

100 g/m² par semaine en une ou plusieurs fois.



PRÉCAUTIONS

Refermer le sac après usage. Stocker dans un endroit sec et frais.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



JN4T010 2013



27, avenue F. Roosevelt - BP 70158 - F
35408 ST-MALO Cedex • Tél. : 33(0)2 99 20 65 20

NOUVEAU

LE CONFORT AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

- BIEN-ÊTRE ANIMAL
- HYGIÈNE ET SANTÉ
- PERFORMANCES



www.timacagro.fr

UNE ACTION À 360°

PROBLÉMATIQUE

Litière non maîtrisée



Risque Sanitaire

- Mammites
- Boîteries
- Diarrhées
- Métrites



Inconfort des animaux

- Humidité
- Ammoniac
- Salissures
- Prolifération insectes



Conséquence sur les productions

- Qualité du lait ↘
- Production laitière ↘
- Croissance ↘
- Fertilité ↘
- Santé du troupeau ↘

BÉNÉFICES

Litière assainie



Milieu sain

- Frais sanitaires ↗
- Longévité ↗
- Reproduction ↗



Bien-être animal

- Confort
- Propreté
- Odeurs ↘



Production sécurisée

- Qualité du lait ↗
- Production laitière ↗
- GMQ ↗
- Pénalités abattoir ↘


PERTES ÉCONOMIQUES

RENTABILITÉ DE L'ÉLEVAGE €

ASSÉCHANT - ASSAINISSANT - CAPTEUR D'ODEURS ET DE NH₃

COMPOSANTS ASSÉCHANTS HAUTE PERFORMANCE

- Absorption irréversible (pas de boue ou de pâte)



Encore plus puissant que l'ACTISAN'R!

SUBSTANCES ACIDIFIANTES

- Acidification sensible de la surface de la litière



Favorisent les flores acidophiles (contribuant à réduire l'impact des germes pathogènes)

SUBSTANCES AROMATIQUES ASSAINISSANTES


- Libération de composés aromatiques



Action simultanée de l'acidification et de l'assèchement pour maîtriser l'hygiène de la litière

CAPTEURS D'AMMONIAC

- Pompe à azote
- limitant les risques de fragilité respiratoire liés à l'ammoniac



Relargage retardé dans le sol après épandage des effluents

