

DIARRH'PECT

ALIMENT COM PLÉMENTAIRE POUR VEAUX, CHEVREAUX, PORCELETS

DIF performance



PRÉSENTATION
Poudre

COMPOSITION

Dextrose, Farine de riz, Farine de caroube, Protéine de pomme de terre, Huile de coco, Lactosérum doux en poudre, Téguments d'ispaghul, Chlorure de sodium, Bicarbonate de sodium, Sorbitol, Chlorure de potassium

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéine brute	10,0 %
Matières grasses brutes	6,6 %
Cellulose brute	2,9 %
Cendres brutes	12,5 %
Sodium	3,3 %
Lysine	0,5 %
Méthionine	0,2 %

ADDITIFS /kg

STABILISATEURS DE LA FLORE INTESTINALE

Enterococcus faecium - NCIM B 10415 (4b1705) : 10,0 x 10⁹ UFC

ANTIOXYGENES

Butylhydroxytoluène (BHT) (E 321) : 196mg

MODE D'EMPLOI

VEAUX :

En cas de diarrhée, distribuer au minimum 2 repas avec DIARRH'PECT dilué dans 2 litres d'eau tiède, à raison de 50 g par litre.

En prévention, DIARRH'PECT se distribue les premiers jours suivant la naissance, suite à un transport ou pendant les périodes délicates, à raison de 20 g dans la buvée.

CHEVREAUX ET PORCELETS :

10 g par 10 kg de poids vif matin et soir, dans la buvée.

VEAUX DE BOUCHERIE :

Jour 1 :

1er repas - 2 litres d'eau + 100 g de DIARRH'PECT sans aliment d'allaitement.

2ème repas - 2 litres d'eau + 100 g de DIARRH'PECT + 100 g d'aliment d'allaitement.

Jour 2 :

1er repas - 2 litres d'eau + 50 g de DIARRH'PECT + 150 à 180 g d'aliment d'allaitement.

2ème repas et tous les suivants - 2 litres d'eau + 200 à 250 g d'aliment d'allaitement.

Cuillère doseuse de 20 g.

AUTRES INDICATIONS

Conserver dans un endroit frais et sec.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Fabriqué par un site certifié OQUALIM RCNA-STNO, convient aux filières « Nourri sans OGM < 0,9% ».

DLUO : 12 mois



expert en diététique animale

499 Rue des Valois - PA des Marches de Bretagne - St Hilaire de Loulay - 85600 MONTAIGU-VENDÉE

www.difagri.fr

Fabriqué par : FR n° 85 224 002

2,5KG

20240131 65011252