

# DIF'ALLAITANT

ALIMENT MINÉRAL DIÉTÉTIQUE POUR VACHES LAITIÈRES ET ALLAITANTES

OBJECTIF NUTRITIONNEL : APPORT PROLONGÉ EN OLIGO-ÉLÉMENTS ET/OU VITAMINES CHEZ LES ANIMAUX À L'HERBAGE



DIF'expertise

## COMPOSITION

Remoulage de blé, Graines de soja extrudées, Phosphate monobasique, Carbonate de calcium, Levures *Saccharomyces cerevisiae* inactivées, Coproduits de blé, Acides gras d'huile de colza, Oxyde de magnésium

## CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Phosphore	3,0 %
Calcium	8,2 %
Magnésium	2,2 %
Sodium	0,1 %
Cendres insolubles dans HCl	3,9 %
Protéine brute	15,8 %
Matières grasses brutes	8,6 %

## ADDITIFS /kg

### VITAMINES

Vitamine A (3a672a) : 3 000 000 UI

Vitamine D3 (3a671) : 356 000 UI

Vitamine E (3a700i) : 6 010 UI

Vitamine C (3a300) : 3 000mg

### OLIGO-ELEMENTS

Zinc (Oxyde de zinc) (3b603) : 20 000mg

Zinc (Chélate de zinc et de glycine hydraté) (3b607) : 5 000mg

Manganèse (Oxyde de manganèse (II)) (3b502) : 15 000mg

Cuivre (sulfate de cuivre (II) pentahydraté) (3b405) : 4 000mg

Cuivre (chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté) (3b413) : 1 000mg

Iode (iodate de calcium anhydre) (3b202) : 800mg

Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II)) (3b304) : 180mg

Sélénium (Sélénite de sodium) (3b801) : 100mg

Sélénium (Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés) (3b802) : 50,0mg

Sélénium (Levure sélénée inactivée *Saccharomyces cerevisiae* CNOM

I-3399) (3b812) : 20,0mg

### ANTI-AGGLOMERANTS

Sépiolite (1g562) : 50 000mg

### CONSERVATEURS

Acide sorbique (sorbate de potassium) (1k202) : 373mg

### SUBSTANCES AROMATIQUES

2b - Mélange de substances aromatiques :

## MODE D'EMPLOI

Vaches laitières 60 g/jour/ animal, pendant 5 à 10 jours.

Chèvres laitières 10 g/jour/ animal, pendant 5 jours.

Vaches allaitantes 40 g/jour/ animal.

Utiliser 2 fois par semaine.

Ou, Distribuer pendant 10 jours par mois.

Avant utilisation et avant prolongation de la durée d'utilisation, consulter un expert en nutrition.

Avant utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste au sujet :

a) de l'équilibrage des oligo-éléments dans la ration journalière.

b) du statut en oligo-éléments du troupeau.

## AUTRES INDICATIONS

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Conserver dans un endroit frais et sec.

100 % de la vitamine C est apporté sous forme enrobée.

Une teneur en cuivre inférieure à 20 mg/kg de la ration journalière totale peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée, respecter le mode d'emploi.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont utilisés à la teneur max autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.

Fabriqué par un site certifié OQUALIM RCNA-STNO, convient aux filières « Nourri sans OGM < 0,9% ».

DLUO en mois : 9

**Difagri**  
expert en diététique animale

20KG

